

疫苗	種類	0歲	6週	2個月	3個月	4個月	5個月	6個月	7個月	8個月	9~11個月	12~15個月	16~17個月	18~23個月	2歲	3歲	4歲	5歲	6歲	7歲	8歲	9歲	10歲以上	
b型流感嗜血桿菌	滅活疫苗			①	②	③	注意、出生後七個月內接種第一劑者注射數和規則會改變					④	一歲以後第四次接種											
肺炎鏈球菌 (PCV13)	滅活疫苗			①	②	③	間隔四週					④												
B型肝炎	標準			① ② 間隔二十週 (大概五個月) ③											與第一次間隔二十週。注意、只第三次乙型流感嗜血桿菌 (HIB)、肺炎鏈球菌有時候不可同時接種									
	母子感染預防	①	②	接種到出生後到十四週六日								③												
輪狀病毒	1價			①	②																			
	5價			①	②	③	間隔四週					擇一接種。接種完第一劑後不可更改												
四联 (DPT-IPV)	滅活疫苗	自由選擇、至少四次		①	②	③	至少間隔三週。如果間隔四週、容易和乙型流感嗜血桿菌 (HIB)、肺炎鏈球菌同時接種					④	(到七、五歲)											
3種混合 (DTap) 白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗 十小兒麻痺症 / 急性無力肢體麻痺	滅活疫苗			①	②	③	間隔至少六個月。最好間隔一年。					④												
白喉、破傷風混合疫苗 (DT)	滅活疫苗																					①	11歲 12歲	
卡介苗 (BCG)	活疫苗	未滿三個月不可接種					①	推薦接種出生後五個月以上																
麻风二联 (MR)	活疫苗											①										②		
水痘	活疫苗											①	間隔三個月	②										
腮腺炎	活疫苗											①												
日本腦炎	滅活疫苗																					①	②	
流行性感冒 / 流感	滅活疫苗																							
人類乳突病毒 (HPV)	滅活疫苗																							

定期接種的推薦期間

定期接種可能的期間

任意接種的推薦期間

任意接種可能的期間

可能用健康保險的時期

